

Plantenexcursie Bussum-Zuid

Zondag 7 september 2025 o.l.v. Peter Wetzels

*Voor alle verslagen van de Plantenwerkgroep zie
<https://tinyurl.com/Plantenwerkgroep>*

Op zondag 7 september 2025 begon om elf uur een groep van 19 personen aan een inventarisatie van een kilometerhok rondom station Bussum-zuid.

Er waren 5 deelnemers die nog niet veel plantenkennis hadden en die heeft Hanneke Waller onder haar hoede genomen.

Omdat de rest toch nog een grote groep vormde, was de voortgang traag en is het niet helemaal gelukt om alle biotopen in hok te bezoeken. De Franse Kampheide en alles ten oosten van het spoor is niet bezocht. Wel zijn er bekeken: woonwijken, een kerkhof, parkeerterreinen, een oud industrieterrein, afwateringsloten en ruige bermen.



Dit leverde 246 soorten op. De gelopen route was ruim vier kilometer lang en we hebben er vijf uur over gedaan inclusief een pauze op het terras van het sportcentrum de Zandzee.

Omdat het al laat in het seizoen was hebben veel planten geen bloemen of vruchten. Algemene soorten worden vegetatief herkend maar voor zeldzame soorten zijn de diverse apps met automatische herkenning erg handig. Het is wel zaak de identificaties te controleren. Het gaat vaak goed maar soms worden er rare missers gemaakt. Een enkele keer is dit meteen duidelijk, maar vaak moet er vergeleken worden met foto's op betrouwbare sites zoals [Verspreidingsatlas.nl](https://www.verspreidingsatlas.nl), [waarneming.nl](https://www.waarneming.nl) of [Blumeninschwaben.de](https://www.blumeninschwaben.de)

Als dat niet voldoende is dan betekent dat thuis de naslagwerken raadplegen.

Dagwinde, Amerikaanse gleditsia, Franchet's cotoneaster, Witte moerbeï, Japanse sierkers en Moseik werden er mee op naam gebracht. De laatste drie soorten leverden na afloop van de excursie toch nog veel uitzoekwerk op voordat de identiteit zeker was. Vooral de Japanse sierkers leverde eerst veel vraagtekens op. Het was een soort kers, maar zonder bloemen of vruchten leek het niet mogelijk de soort te duiden. Uiteindelijk is dit gelukt omdat deze soort een bijzondere tanding op de bladrand heeft.

Een afwateringssloot bevatte een grote populatie Krabbenscheer. Ook kwam er Parelvederkruid voor: een invasieve soort.

Voor het overige was Bussum-Zuid een doorsnee stadswijk met de te verwachten soorten.

Stekelige hanenpoot, Kroontjeskruid, Okkernoot, Zilverhaver, Straatwolfsmelk, Gele helmbloem, Steenbreekvaren en Gaspeldoorn waren wel de leukste soorten.

Met zonnig, niet al te warm weer was het een mooie excursie waarvan iedereen genoten heeft.

<https://www.verspreidingsatlas.nl/waarnemingen/overzicht/704858>

Peter Wetzels

*Voor alle verslagen van de Plantenwerkgroep zie
<https://tinyurl.com/Plantenwerkgroep>*



Bezoek aan de afwateringssloot



Prunus serrulata - Japanse sierkers. Tanding van de bladrand



Quercus cerris - Moseik Lange steunblaadjjes



Quercus cerris - Moseik Beharing