

Excursie Hok 138-471 Spanderswoud en Corversbos op zondag 19 april 2026

Op zondag 19 april begonnen we met negen deelnemers voor het Comeniuscollege in de wijk Nimrodpark van Hilversum. De school ligt in een villawijk en die is bosachtig maar heeft ook kenmerken van een stedelijke omgeving.

Zoals gewoonlijk kostte het een uurtje om de eerste vijftig soorten te noteren. In dit uurtje was er al een heel leuke vondst: een grote groeiplaats van Lathyruswikke (*Vicia lathyroides*). Dit minuscule plantje heeft felblauwe bloempjes en komt vooral in de duinen voor. Buiten de duinen is deze soort zeldzaam en is vooral langs de Maas te vinden. Lathyruswikke wordt vaak gemist vanwege de vroege bloei en de minieme grootte. In ieder geval de derde vindplaats bij Hilversum.

Ook de vondst van Hoenderbeet (*Lamium amplicaulle*) is leuk



Lathyruswikke (*Vicia lathyroides*)



Hoenderbeet (*Lamium amplicaulle*)

Zoals gewoonlijk vinden we rond Hilversum Knolboterbloem (*Ranunculus bulbosus*). Rond Amsterdam komt de soort weinig voor dus dit is een leuke vondst. Knolboterbloem is door de teruggeslagen kelkbladen herkenbaar. Omdat Behaarde boterbloem hier ook voorkomt is nader bestudering van de beharing of het uitgraven van de knol nodig om zekerheid te krijgen.

In dit bosrijke stuk vinden we veel verwilderde bomen zoals Gewone zilverspar (*Abies alba*), Weymouthden (*Pinus strobus*), Reuzenlevensboom (*Thuja plicata*) en Kaukasische zilverspar (*Abies nordmanniana*). De herkenningsapps zijn bij het herkennen erg nuttig. We controleren wel of de naam klopt maar dit gaat veel sneller dan in een flora uitzoeken wat het kan zijn.



Ook Japanse bamboe (*Pseudosasa japonica*) stond verwilderd in een bosrand. Te herkennen aan de langgerekte papierachtige schedes boven de knopen. Van deze lastige en onbekende soorten maken we altijd een waarneming aan in waarneming.nl met goede foto's. Als de waarneming wordt goedgekeurd hebben we zekerheid.

We lopen door naar het akkerreservaat van het Corversbos. Slofhak (*Anthoxanthum aristatum*) komt er massaal voor als kleine toefjes of polletjes. Dit gras is te herkennen aan de haren die op de schedemond staan. Als akkeronkruid is Slofhak zeldzaam geworden. Dit geldt zeker ook voor Glad biggenkruid (*Hypochaeris glabra*), kleine als rozetten aanwezig. Deze soort is als akkeronkruid vrijwel verdwenen. Aan de kust komt de Glad biggenkruid nog wel veel voor in laagblijvend duingrasland. Langs de akkerrand was Inkarnaatklaver (*Trifolium incarnatum*) te herkennen aan de zwartpaars gerande steunblaadjes



Glad biggenkruid (*Hypochaeris glabra*)




Inkarnaatklaver (*Trifolium incarnatum*)

Na de akkers ging de inventarisatie door naar het landgoed Gooilust. Op weg wordt een bekende vindplaats van Groot glaskruid (*Parietaria officinalis*) bezocht. Anders dan de nauwe verwant Klein glaskruid (*Parietaria judaica*) profiteert de soort niet van de opwarming en is haar verspreiding stabiel.


Wegens tijdgebrek gaan we het landgoed Gooilust niet op maar wandelen we langs de afscheidingsloot langs de Corverslaan. Hier scoren we watergeboden soorten zoals Gele waterkers (*Rorippa amphibia*).

Het laatste stuk naar het startpunt loopt door bos waar we Drienerfmuur (*Moehringia trinervia*), Rankende helmbloem (*Ceratocarpus claviculata*) en Bosaardbei (*Fragaria vesca*) vinden. Tamme kastanje (*Castanea sativa*) is de laatste soort die gestreept wordt wat het totaal aantal aan soorten brengt op 186. Dit is in vier uur gedaan bij fris maar zonnig weer.

Verspreidingskaarten van een aantal genoemde soorten



Blauw vierkanten geven aan dat de soort voor 2000 voorkwam maar daarna niet meer.



Bij benadering gelopen route

De verslagen van de Plantenwerkgroep van de KNNV-Amsterdam zijn te vinden via deze [inhoudsopgave](#)